


«PrEP»

Доконтактная профилактика в ключевых группах



СПИД.ЦЕНТР

Николай Лунченков
ГКУЗ МО ЦПБ СПИД ИЗ, фонд «СПИД.ЦЕНТР»
СПБ, октябрь 2018



PrEP - для кого?

- Мужчины, практикующие секс с мужчинами
- Люди, употребляющие наркотики
- Трансгендерные женщины
- Секс-работницы и секс-работники
- Для каждой группы существует свой процент эффективности

Доказательная база

Исследование	Год публикации результата	Ключевая группа	Страна исследования	Количество участников	ДКП агент	Снижение новых случаев инфекции
CAPRISA 004	2010	Женщины 18-40 лет	ЮАР	889	Вагинальный гель с TDF	39 %
iPrEx	2010	MCM и ТГ	Международное исследование	2499	Трувада	44 %
FEM-PrEP	2011	Женщины 18-35	Африка	1950	Трувада	0
Partners PrEP	2011	Серодискордантные пары	Кения и Уганда	4758	Трувада и TDF	75% Трувада 65% Тенофовир
TDF-2	2011	Гетеросексуальные мужчины и женщины 18-35	Ботсвана	1200	Трувада	63 %
VOICE	2012	Женщины 18-45	Африка	5029	Вагинальный гель с TDF	0
Bankok tenofovir study	2013	Наркопотребители	Тайланд	2413	Тенофовир	49 %
FACTS 001	2015	Женщины 18-30	ЮАР	2059	Вагинальный гель с TDF	0
IPERGAY	2015	MCM и ТГ	Франция и Канада	400	Трувада	86 %
PROUD	2015	MCM и ТГ	Великобритания	544	Трувада	86 %

Показания к ДКП

- Вагинальный или анальный секс без презерватива, более чем с одним партнером
- Наличие сексуального партнера из ключевой группы
- Наличие ЗППП за последний год
- Использование ПКП
- Желание и мотивация начать ДКП

Противопоказания к ДКП

- Наличие ВИЧ-инфекции
- Симптомы острой ВИЧ-инфекции
- Высокий уровень креатинина
- Индивидуальная непереносимость одного или двух компонентов ДКП

Безопасна ли ДКП для всех?

Да

- Высокая эффективность
- Побочные эффекты крайне редки и легко контролируемы
- Резистентность маловероятна (статистически маловероятна) + необходимо тестирование на наличие ВИЧ-инфекции до начала приема
- Безопасна при беременности и кормлении грудью

Необходимые обследования при первом визите

Обследования	Для чего?
Тест на ВИЧ-инфекцию	Выявление новых случаев. Если последний рискованный контакт был менее 72 часов назад - ПКП на 28 дней.
Биохимия крови (креатинин)	Исключить раннюю ХБП
Тест на гепатит В	Если отрицательно - вакцинировать/ревакцинировать. Если положительно - развернутая диагностика и консультация о лечении гепатита В
Тест на гепатит С	Диагностика и последующее лечение.
Тест на сифилис	Диагностика и последующее лечение.
Скрининг на прочие ЗППП	Диагностика и последующее лечение.
Консультирование	Уточнить, есть ли у клиента риск инфицирования. Предложить дополнительные методы профилактики. Понимание мотивации и приверженности клиента.

Создание системы доступа к ДКП

Определение группы с высокой частотой встречаемости ВИЧ-инфекции.

Определение локации для точки доступа к ДКП

- В условиях уже существующих сервисов для ключевых групп
- В точке доступа должны иметься условия для проведения: тестирования на ВИЧ-инфекции, ЗППП, начало АРТ и медицинской консультации

Как начать ДКП программу?

- Убедиться в наличии всех необходимых условий
- Обучить персонал
- Повысить осведомленность об этом методе профилактики среди ключевых групп
- Привлечь сообщество к работе
- Скомбинировать с другими методами профилактики


Начало ДКП программы

- Обеспечивать качественное консультирование по всем особенностям
- Новые случаи ВИЧ-инфекции доводить до лечения
- Быть открытым для всех, кто хочет начать эту программу
- Предлагать другие методы профилактики

Контроль деятельности и отчетность

Финансовая выгода

- Для получения значительной прибыли необходим охват не менее 3% от общего количества ключевых групп
- ДКП сервис обходится в 40% от общих расходов на лечение



Source: UNAIDS

Потенциальные вопросы

- Зачем тратить деньги на ДКП, если их не хватает даже на охват АРТ?
- Если будет ДКП, сместится ли фокус с ЛЖВ?
- Правда, что с ДКП люди перестают пользоваться презервативами?
- Правда, что будет всплеск ЗППП?
- Всем ли представителям ключевых групп нужна ДКП?
- ДКП работает у всех?
- Есть ли риск получения резистентных штаммов вируса?

Благодарю за внимание

nik@spid.center