

Вид исследования
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>УЗИ лимфоузлов, щитовидной железы, почек и надпочечников</b> - не требует подготовки</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>УЗИ молочных желез</b> – проводится в начале менструального цикла (в последние дни месячных или сразу после месячных на 2-7-й день менструального цикла)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>УЗИ брюшной полости</b> (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) проводится НАТОЩАК с утра до 12.00. С вечера ничего не есть, последний прием пищи за 12 часов до УЗИ (пациенты с сахарным диабетом могут соблюдать свой обычный режим приема пищи), пить можно только чистую воду в небольшом количестве. За три дня до исследования исключить из рациона газообразующие продукты – яблоки, горох, ржаной хлеб, молоко, фасоль, капусту, свежие овощи, фрукты и сладкие блюда. Накануне исследования принимать <b>Эспумизан</b> – по 2 капсулы 3 раза в день и 4 капсулы утром в день исследования (всего 10 капсул). Почки не входят в УЗИ брюшной полости.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>УЗИ гинекологическое</b> поверхностным датчиком требует тугого наполнения мочевого пузыря (либо накапливать мочу в мочевом пузыре в течение дня, либо за один час до УЗИ выпить один литр чистой воды БЕЗ ГАЗА; при длительном отсутствии приема воды может потребоваться большее количество воды – иметь воду в запасе).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>УЗИ мочевого пузыря</b> - требует тугого наполнения мочевого пузыря. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ у женщин см. УЗИ гинекологическое;</li> <li>○ у мужчин – лучше накапливать мочу в мочевом пузыре в течение дня, прием большого количества воды нежелателен из-за опасности затрудненного опорожнения мочевого пузыря.</li> </ul> </li> </ul>

### НЕ ПРОВОДЯТСЯ

- УЗИ пороков развития плода в 2-3-м триместре беременности (обращаться к акушерам-гинекологам)

**Внимание!** Пациентам с повышенным артериальным давлением или приступами судорог необходимо наполнять мочевой пузырь путем накапливания мочи в течение дня, прием большого количества воды нежелателен из-за опасности провоцирования гипертонического криза или приступа судорог.