

«Целзентри (маравирок) - первый в новом классе»




# Место препарата Целзентри (маравирок) в международных рекомендациях по лечению ВИЧ-инфекции

**Кижло Светлана Николаевна**  
заведующая инфекционным отделением ГУЗ СПб «Центр по  
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными  
заболеваниями»

**г. Санкт-Петербург, 10 октября 2012 года**

*Выступление осуществляется при финансовой поддержке компании ВииВ Хелскер. Информация, включенная в презентацию, отражает мнение автора и может не совпадать с позицией ВииВ Хелскер. Компания ВииВ Хелскер не несет ответственности за возможные нарушения авторских прав и иных прав*

# Антагонисты CCR5 (маравирок) входят во все ведущие рекомендации при рассмотрении смены АРТ



# Портрет пациентов : кому может быть рекомендован/назначен маравирок

Линия терапии	Маравирок	Рекомендации
Схемы резерва	•Маравирок - один из рекомендуемых препаратов выбора, как препарат нового класса с новым механизмом действия	BHIVA-2012 DHHS-2012 EACS-2011 IAS-USA-2012
	•Маравирок, как пероральный препарат нового класса, может быть хорошей альтернативой инъекционному энфувиртиду	DHHS-2012

1. <http://www.europeanaidsclicinalsociety.org/>
2. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012
3. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402
4. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30thApril 2012)

# Портрет пациентов : кому может быть рекомендован/назначен маравирок

Линия терапии	Маравирок	Рекомендации
Схемы третьего ряда	•Маравирок - один из рекомендуемых препаратов выбора, как препарат нового класса с новым механизмом действия	BHIVA-2012 DHHS-2012 EACS-2011 IAS-USA-2012

1. <http://www.europeanaidsclinicalsociety.org/>
2. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012
3. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402
4. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30th April 2012)

# Портрет пациентов : кому может быть рекомендован/назначен маравирок

Линия терапии	Маравирок	Рекомендации
Схемы второго ряда	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>При первичной неудаче на ННИОТ</b> маравирок может быть опцией для таких пациентов, однако, некоторые эксперты советуют убедиться в отсутствии мутаций к НИОТ</li> </ul>	BHIVA-2012, IAS-USA-2012
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>При переключении с ИП</b>, независимо от мутаций резистентности: маравирок как одна из альтернатив дарунавиру</li> </ul>	BHIVA-2012
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>При вирусологической неудаче на ралтеgravире</b>: маравирок как одна из опций при наличии 2-х активных НИОТ</li> </ul>	BHIVA-2012

1. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012
2. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402
3. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30th April 2012)

# Портрет пациентов : кому может быть рекомендован/назначен маравирок

## **Применение при сочетанной инфекции ВИЧ-туберкулез:**

- Маравирок может применяться совместно с рифампицином при лечении туберкулеза у пациентов с сочетанной инфекцией, но требует повышения дозировки (DHHS-2012, EACS-2011)
- Маравирок может применяться совместно с рифабутином в стандартной дозировке

1. <http://www.europeanaidsclicinalsociety.org/>
2. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012
3. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402
4. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30thApril 2012)


# Что еще есть полезного у препарата Целзентри для клинической практики:

- ✓ Отсутствие перекрестной резистентности с препаратами других классов (возможность применения в различных линиях АРТ)
- ✓ Хороший профиль безопасности и переносимости (данные 240 нед наблюдения)
- ✓ Опыт применения у пациентов с сочетанным гепатитом С


1. <http://www.europeanaidsclicinalsociety.org/>
2. U.S. Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and adolescents. Revised 27 Mar 2012
3. Thompson MA, et al. JAMA. 2012;308(4):387-402
4. BHIVA guidelines for the treatment of HIV-1 positive adults with antiretroviral therapy 2012 (30th April 2012)
5. Gulick R et al. 19th IAC. 22-27 Jul 2012. Abstract TUPE029

# Когда же следует задуматься о назначении маравирока? Пациенты с опытом терапии и R5-тропным ВИЧ-1

**НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ**  
предшествующего режима АРТ – 2я, 3я  
линии АРТ, терапия спасения



**Сопутствующие заболевания**  
(туберкулез, гепатиты)



**Непереносимость предшествующего  
режима**




# В Европе, и в США маравирок все чаще назначают в ранних линиях ART (результаты маркетингового исследования)

## Европа

## Причина назначения MVC

## США



**Спасибо!**